

A new species of *Metavononoides* from the Brazilian Atlantic Forest (Arachnida: Opiliones: Cosmetidae)

CLÁUDIO P. FERREIRA¹, DENIS RAFAEL PEDROSO² & ADRIANO B. KURY³

Laboratório de Aracnologia, Departamento de Invertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNUFRJ), Quinta da Boa Vista s/n, São Cristóvão CEP 20940040, Rio de Janeiro, RJ, Brasil;

¹cppires@gmail.com, ²drpedroso@mn.ufjr.br, ³adrianok@gmail.com

Abstract

A new species of Cosmetidae belonging to the genus *Metavononoides* Roewer, 1928 is herein described. *Metavononoides melanacanthus* sp. nov. is clearly recognized by its distinctive tarsal formula, its long legs (reaching over 60 mm), and by its characteristic color pattern. The new species is the twelfth species included in the genus. It is known only from two localities: the type locality, Barra de São João, Casimiro de Abreu and from Aldeia Velha, Rio de Janeiro, Brazil.

Keywords: Laniatores, Taxonomy, Rio de Janeiro, Neotropical, WWF Ecoregion NT0160

Uma nova espécie de *Metavononoides* da Mata Atlântica (Arachnida: Opiliones: Cosmetidae)

Resumo

Uma nova espécie de Cosmetidae pertencente ao gênero *Metavononoides* Roewer, 1928 é descrita. A localidade tipo é Barra de São João, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Brasil, ocorrendo também em Aldeia Velha, no mesmo estado. *Metavononoides melanacanthus* sp. nov. é claramente reconhecida por sua fórmula tarsal, pelo comprimento de suas patas (podendo superar 60 mm), e pelo seu padrão de cores. A nova espécie é a décima segunda espécie desse gênero.

Palavras-chave: Laniatores, Taxonomia, Rio de Janeiro, Neotropical, Eco-região WWF NT0160