

The taxonomic status of *Phrynopus pereger* Lynch 1975 (Amphibia, Anura, Leptodactylidae)

EDGAR LEHR^{1,2} & CÉSAR AGUILAR³

¹Present address: Natural History Museum and Biodiversity Research Center, Division of Herpetology, The University of Kansas, Jayhawk Boulevard 1345, Lawrence, KS 66045-7561, U.S.A.

²Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Tierkunde, Königsbrücker Landstrasse 159, D-01109 Dresden, Germany

³Museo de Historia Natural, Departamento de Herpetología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Av. Arenales 1256, Jesús María, Ap. 14-0434, Lima, Peru.

Abstract

Live and freshly preserved specimens of *Phrynopus pereger* have terminal discs with a small, papilla-like projection and weak, interrupted circumferential grooves separating the disc from a pad. Based on external morphological and osteological characters *Phrynopus pereger* is transferred to *Eleutherodactylus*. Information on its natural history and distribution, and photos in life are provided. All Peruvian *Phrynopus* (except *P. pereger*) occur at elevations between 2600 and 4400 m.

Key words: *Eleutherodactylus pereger* new combination, Anura, *Phrynopus*, Peru, Andes, cloud forests

Resumen

Especímenes vivos y recién preservados de *Phrynopus pereger* tienen discos terminales con una proyección pequeña en forma de papila y surcos circunferenciales débiles no interrumpidos, y separando el disco de una almohadilla. En base a caracteres morfológicos y osteológicos *Phrynopus pereger* es transferido a *Eleutherodactylus*. Se provee de información sobre la historia natural y distribución, y fotos en vida. Todos los *Phrynopus* peruanos (excepto *P. pereger*) ocurren a elevaciones entre los 2600 y 4400 m.

Palabras clave: *Eleutherodactylus pereger* nueva combinación, Anura, *Phrynopus*, Perú, Andes, bosques nublados